

*Como uno mismo
otra vez*
— *con SAPHNELO* —

No es un paciente real

SAPHNELO tiene el potencial de reducir la actividad de la enfermedad del lupus, ayudándole a sentirse como uno mismo otra vez.*

*En comparación con otros medicamentos para el lupus administrados por sí solos. La reducción de la actividad de la enfermedad al final del tratamiento fue estadísticamente significativa en 3 de los 4 estudios. Los resultados pueden variar.

SAPHNELO es para adultos con lupus eritematoso sistémico (LES o lupus) de moderado a grave que toman otros medicamentos para combatir el lupus. No es para tratar la nefritis lúpica activa grave o el lupus del sistema nervioso central activo grave.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- No use SAPHNELO si es alérgico al anifrolumab-fnia o a alguno de sus ingredientes
- Antes de comenzar el tratamiento con SAPHNELO, infórmele a su proveedor de atención médica todos sus problemas de salud, lo que incluye lo siguiente:
 - Cree que tiene una infección o tiene una que reaparece continuamente

Consulte la [Información de seguridad importante](#) adicional cuidadosamente y la [Información de prescripción](#) completa, incluida la [Información para el paciente](#).

¿POR QUÉ ELEGIR SAPHNELO?



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

- Antes de comenzar el tratamiento con SAPHNELO, infórmele a su proveedor de atención médica todos sus problemas de salud, lo que incluye lo siguiente: (continuación)
 - Tiene programado recibir alguna vacuna o cree que podría necesitar una. No debe recibir vacunas vivas durante el tratamiento con SAPHNELO
 - Tiene o ha tenido algún tipo de cáncer.
 - Recibe otros medicamentos biológicos o anticuerpos monoclonales.
 - Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si SAPHNELO puede dañar a los bebés en gestación. Informe a su proveedor de atención médica si está, podría estar, o planea quedar embarazada durante el tratamiento con SAPHNELO
 - El registro de exposición durante el embarazo supervisa el desenlace de los embarazos en las mujeres que estuvieron expuestas a SAPHNELO. Puede obtener más información sobre el registro llamando a AstraZeneca al 1-877-693-9268.
 - Si está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce si SAPHNELO se transmite a la leche materna.

Consulte la [Información de seguridad importante](#) adicional cuidadosamente y la [Información de prescripción completa](#), incluida la [Información para el paciente](#).



LA REDUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA ENFERMEDAD MEJORA LOS SÍNTOMAS DEL LUPUS

En estudios clínicos, SAPHNELO redujo la actividad de la enfermedad del lupus entre los órganos afectados, lo cual mejora los síntomas del lupus, en algunas personas, en cuestión de semanas.*†

SAPHNELO también puede aportar otros beneficios a algunos pacientes



REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA DE ESTEROIDES

SAPHNELO es el único medicamento biológico aprobado por la FDA para tratar a adultos con lupus de moderado a grave que demostró una reducción significativa en el uso de esteroides.*‡§



DISMINUCIÓN DE BROTES

Algunos pacientes que tomaron SAPHNELO tuvieron menos brotes en comparación con aquellos que no complementaron otros medicamentos contra el lupus con SAPHNELO.¶

SAPHNELO se encuentra disponible en versión autoinyectable semanal o en una infusión que se administra cada 4 semanas. Hable con su médico sobre la opción que mejor se adapte a su estilo de vida.

Las experiencias individuales pueden variar. Siempre analice su plan de tratamiento con su proveedor de atención médica.

*En comparación con otros medicamentos para el lupus administrados por sí solos.

†La reducción de la actividad de la enfermedad al final del tratamiento fue estadísticamente significativa en 3 de los 4 estudios.

‡Se observó una disminución del uso de esteroides en los 4 estudios, el cual fue estadísticamente significativo en 1 de ellos.

§En algunos pacientes que tomaban una dosis ≥ 10 mg de esteroides orales por día al inicio del estudio, la dosis de este medicamento se redujo a ≤ 7.5 mg por día.

¶Dadas las limitaciones de este estudio, los resultados son descriptivos y meramente informativos. Su experiencia puede ser diferente.

 **Saphnelo**[®]
(anifrolumab-fnia)
Intravenous Use 300 mg/vial
Subcutaneous Use 120 mg/0.8 mL



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

Informe a su proveedor de atención médica todos los **medicamentos que toma**, incluidos los medicamentos con receta y los de venta sin receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. SAPHNELO puede afectar la forma en que actúan otros medicamentos, y otros medicamentos pueden afectar la forma en que actúa SAPHNELO.

Consulte la [Información de seguridad importante](#) adicional cuidadosamente y la [Información de prescripción completa](#), incluida la [Información para el paciente](#).

¿PUEDE SAPHNELO AYUDARLE A SENTIRSE COMO UNO MISMO OTRA VEZ?

Hable con su médico sobre cómo complementar su plan de tratamiento contra el lupus con SAPHNELO utilizando la Guía de conversación con el médico.

Está diseñado para ayudarle a iniciar una conversación sobre sus objetivos de tratamiento contra el lupus y si le convendría complementarlos con SAPHNELO.

Escanee su guía
personalizada



 **Saphnelo**[®]
(anifrolumab-fnia)
Intravenous Use 300 mg/vial
Subcutaneous Use 120 mg/0.8 mL





SU EQUIPO DE ATENCIÓN SE ENCARGA DE ADMINISTRAR SAPHNELO IV



COLABORACIÓN

Su equipo de atención médica le indicará el lugar donde se lleva a cabo el tratamiento. Puede ser en el consultorio de su médico, en un hospital o en un centro de infusión.



RUTINA

Generalmente, SAPHNELO IV se administra 1 vez cada 4 semanas, de modo que pueda planificar el tratamiento como parte de su rutina mensual habitual.



DURACIÓN

Normalmente, administrar la dosis completa de la infusión tarda unos 30 minutos. Piense en esto como un bloque de “tiempo para mí” a fin de ponerse al día con lo pendiente.



ADMINISTRACIÓN

Su equipo de atención médica se encarga de administrarle SAPHNELO IV a través de una aguja que se coloca en una vena.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

A continuación, se indican algunos de los efectos secundarios graves que puede provocar SAPHNELO:

- **Infecciones graves:** SAPHNELO puede reducir la capacidad de su sistema inmunitario para combatir infecciones. Puede tener un mayor riesgo de desarrollar infecciones respiratorias y culebrilla (herpes zóster) durante el tratamiento con SAPHNELO. Las infecciones pueden ser graves y provocar la hospitalización o la muerte. Dígale a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas de una infección:
 - fiebre, sudoración o escalofríos
 - dolores musculares
 - tos
 - dificultad para respirar
 - ardor al orinar
 - orina con más frecuencia
 - diarrea o dolor de estómago
 - temperatura elevada, enrojecimiento o dolor en la piel o llagas en el cuerpo

Consulte la [Información de seguridad importante adicional cuidadosamente](#) y la [Información de prescripción completa](#), incluida la [Información para el paciente](#).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

A continuación, se indican algunos de los efectos secundarios graves que puede provocar SAPHNELO (continuación):

- **Reacciones alérgicas (hipersensibilidad),** incluida la anafilaxia: Pueden producirse reacciones alérgicas graves durante la infusión de SAPHNELO o después de administrársela. Llame a su proveedor de atención médica o busque ayuda de emergencia de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas de una reacción alérgica grave:
 - hinchazón de la cara, boca y lengua
 - problemas para respirar
 - desmayos o mareos
 - sensación de mareo (presión arterial baja)

 **Saphnelo®**
(anifrolumab-fnia)
Intravenous Use 300 mg/vial
Subcutaneous Use 120 mg/0.8 mL

CÓMO FUNCIONA SAPHNELO

El interferón tipo 1 (IFN-1) desempeña un papel fundamental en el lupus. SAPHNELO bloquea la actividad del IFN-1.



IFN-1

son pequeños mensajeros del organismo que envían señales a varios tipos de células inmunitarias para activar el sistema inmunitario cuando es necesario. En el lupus, los niveles del IFN-1 son elevados, lo que aumenta la actividad del IFN-1 y provoca que las células inmunitarias ataquen al organismo.



Hasta un 80 %

de las personas con lupus activo presentan niveles elevados de la expresión del gen IFN-1.



SAPHNELO

bloquea la actividad del IFN-1 actuando en distintas partes de su cuerpo.



SAPHNELO es el primer y único tratamiento aprobado por la FDA para adultos con lupus eritematoso sistémico (LES) de moderado a grave que actúa bloqueando la actividad del IFN-1.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

A continuación, se indican algunos de los efectos secundarios graves que puede provocar SAPHNELO (continuación):

- **Cáncer:** SAPHNELO puede reducir la actividad de su sistema inmunitario. Los medicamentos que afectan el sistema inmunitario pueden aumentar su riesgo de tener ciertos tipos de cáncer

Consulte la [Información de seguridad importante adicional](#) cuidadosamente y la [Información de prescripción completa](#), incluida la [Información para el paciente](#).



LA PLUMA SAPHNELO PEN LLEVA EL TRATAMIENTO HACIA USTED



COMODIDAD

Use SAPHNELO en el hogar o mientras viaja.*



RUTINA

Un horario de inyecciones semanales facilita la integración de SAPHNELO en su rutina.



DURACIÓN

15 segundos es todo lo que se necesita para inyectar SAPHNELO.



FLEXIBILIDAD

SAPHNELO puede conservarse a temperatura ambiente hasta 7 días en caso de que no sea posible refrigerarlo.*

SAPHNELO también está disponible en versión de jeringa precargada autoinyectable. Hable con su médico si cree que podría ser la opción adecuada para usted.

Antes de inyectar SAPHNELO, su proveedor de atención médica puede enseñarle a usted o a un cuidador cómo administrar la inyección. También debe leer las Instrucciones de uso si desea obtener información detallada sobre cómo preparar e inyectar SAPHNELO.

*Si fuese necesario, una caja sin abrir de SAPHNELO Pen puede conservarse a temperatura ambiente hasta por 7 días. De lo contrario, guárdelo dentro del refrigerador en su caja original hasta que esté listo para usar. No lo use si estuvo congelado o expuesto al calor.

SAPHNELO AYUDÓ A PACIENTES REALES A SENTIRSE MÁS COMO ELLOS MISMOS OTRA VEZ



BRIE

Por fin, algo que me funciona.



CHANIQUA

Si hubiera tenido la oportunidad de empezar antes, lo habría hecho.



LYNETT MARIE

Cuando comencé con SAPHNELO, no sabía qué esperar, pero realmente me ha ayudado.



OFELIA

Te da esperanza... de que mañana va a ser un día mejor.

Las experiencias individuales pueden variar. Siempre analice su plan de tratamiento con su proveedor de atención médica.

**ESCANEE PARA
VER HISTORIAS DE
SAPHNELO**



Consulte la [Información de seguridad importante](#) adicional cuidadosamente y la [Información de prescripción completa](#), incluida la [Información para el paciente](#).

DESCUBRA APOYOS Y ASEQUIBILIDAD

Ahorrar con SAPHNELO

Pague tan solo

\$0*

por SAPHNELO

Si le recetan SAPHNELO y tiene un seguro comercial, es posible que pueda obtener SAPHNELO por tan solo \$0*.

Para inscribirse en el Programa de ahorro para pacientes de SAPHNELO, visite saphnelo.com o llame al **1-866-SAPHNELO (1-866-727-4635)** para obtener ayuda.

Sujeto a términos de uso y elegibilidad.

SAPHNELO Supports está aquí para ayudar.

Los pacientes elegibles que se unan a SAPHNELO Supports recibirán un Kit de bienvenida que incluye información sobre cómo comenzar con SAPHNELO, qué esperar, los recursos útiles y opciones de asequibilidad.



Escanee para inscribirse

El apoyo personalizado está a solo una llamada de distancia

El programa

AstraZeneca Access 360™ le brinda apoyo personalizado y le ofrece acceso a un

Navegador de Acceso del Paciente, en el que pueden ayudarle a responder sus preguntas sobre la cobertura del seguro y los costos de su propio bolsillo.



Llame al **1-844-ASK-A360 (1-844-275-2360)**

De lunes a viernes, de 8 AM. a 6 PM., hora del este.

La línea de ayuda de enfermería puede ayudarle a responder algunas de sus preguntas sobre SAPHNELO u otros recursos disponibles. Comuníquese siempre con su equipo de atención médica si tiene preguntas relacionadas con su tratamiento.†



Llame al **1-866-SAPHNELO (1-866-727-4635)**

De lunes a viernes, de 8 AM a 6 PM, hora del este, excepto días festivos.

*El objetivo del Programa de ahorro para Pacientes de SAPHNELO es cubrir los costos de bolsillo de SAPHNELO® (anifrolumab-fnia) y la administración mediante infusión de los pacientes que poseen un seguro comercial hasta un tope de año calendario de \$16,500. Los pacientes que poseen un plan de salud con un seguro comercial que NO cubre SAPHNELO pueden optar al Programa de ahorro para pacientes con cobertura Denegada. Sujeto a términos de uso y elegibilidad. Los pacientes deben tener un seguro médico comercial y una receta válida para SAPHNELO. Los pacientes que estén inscritos en un programa de seguro de medicamentos recetados financiado por el Estado o el Gobierno federal no podrán utilizar este programa, aunque decidan que se les gestione como pacientes no asegurados (que pagan en efectivo). Esta oferta no es un seguro y está restringida a los residentes de Estados Unidos y Puerto Rico. Los pacientes residentes en Massachusetts o Rhode Island no pueden optar a la ayuda para la administración de la infusión. Es posible que apliquen otras restricciones. El paciente debe estar inscrito en el programa antes de utilizarlo. Consulte todos los Términos de uso y elegibilidad en www.saphnelo.com o llame a Access 360 al 1-866-727-4635, de lunes a viernes, de 8 AM a 6 PM, hora del este, excepto días festivos.

Saphnelo®
(anifrolumab-fnia)
Intravenous Use 300 mg/vial
Subcutaneous Use 120 mg/0.8 mL

†Las decisiones sobre su salud y el tratamiento de su afección deben tomarse junto con su proveedor de atención médica. El personal de enfermería de AstraZeneca no puede ofrecer asesoramiento médico y solo puede proporcionar información sobre los medicamentos de AstraZeneca.

Consulte la [Información de seguridad importante](#) adicional cuidadosamente y la [Información de prescripción completa](#), incluida la [Información para el paciente](#).

¿Qué es SAPHNELO?

SAPHNELO es un medicamento recetado que se utiliza para tratar a adultos con lupus eritematoso sistémico (LES o lupus) de moderado a grave y que toman otros medicamentos para combatir el lupus.

Se desconoce si SAPHNELO es eficaz en pacientes con nefritis lúpica activa grave o lupus del sistema nervioso central activo grave. Se desconoce si SAPHNELO es seguro y eficaz en pacientes menores de 18 años.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- **No use SAPHNELO** si es alérgico al anifrolumab-fnia o a alguno de sus ingredientes
- **Antes de comenzar el tratamiento con SAPHNELO, infórmele a su proveedor de atención médica todos sus problemas de salud, lo que incluye lo siguiente:**
 - Cree que tiene una infección o tiene una que reaparece continuamente
 - Tiene programado recibir alguna vacuna o cree que puede necesitar una
No debe recibir vacunas vivas durante el tratamiento con SAPHNELO
 - Tiene o ha tenido algún tipo de cáncer
 - Recibe otros medicamentos biológicos o anticuerpos monoclonales
 - Está embarazada o planea quedar embarazada. Se desconoce si SAPHNELO puede dañar a los bebés en gestación. Informe a su proveedor de atención médica si está, podría estar, o planea quedar embarazada durante el tratamiento con SAPHNELO
 - **El registro de exposición durante el embarazo** supervisa el desenlace de los embarazos en las mujeres que estuvieron expuestas a SAPHNELO. Puede obtener más información sobre el registro llamando a AstraZeneca al 1-877-693-9268.
 - Si está amamantando o planea hacerlo. Se desconoce si SAPHNELO se transmite a la leche materna.

Informe a su proveedor de atención médica todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos con receta y los de venta sin receta, las vitaminas y los suplementos a base de hierbas. SAPHNELO puede afectar la forma en que actúan otros medicamentos, y otros medicamentos pueden afectar la forma en que actúa SAPHNELO.

A continuación, se indican algunos de los efectos secundarios graves que puede provocar SAPHNELO:

- **Infecciones graves:** SAPHNELO puede reducir la capacidad de su sistema inmunitario para combatir infecciones. Puede tener un mayor riesgo de desarrollar infecciones respiratorias y culebrilla (herpes zóster) durante el tratamiento con SAPHNELO. Las infecciones pueden ser graves y provocar la hospitalización o la muerte. Dígame a su proveedor de atención médica de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas de una infección:
 - fiebre, sudoración o escalofríos
 - dolores musculares
 - tos
 - dificultad para respirar
 - ardor al orinar
 - orina con más frecuencia
 - diarrea o dolor de estómago
 - temperatura elevada, enrojecimiento o dolor en la piel o llagas en el cuerpo
- **Reacciones alérgicas (hipersensibilidad),** incluida la anafilaxia: Pueden producirse reacciones alérgicas graves durante la infusión de SAPHNELO o después de administrársela. Llame a su proveedor de atención médica o busque ayuda de emergencia de inmediato si tiene alguno de los siguientes síntomas de una reacción alérgica grave:
 - hinchazón de la cara, boca y lengua
 - problemas para respirar
 - desmayos o mareos
 - sensación de mareo (presión arterial baja)
- **Cáncer:** SAPHNELO puede reducir la actividad de su sistema inmunitario. Los medicamentos que afectan el sistema inmunitario pueden aumentar su riesgo de tener ciertos tipos de cáncer

A continuación, se indican algunos de los efectos secundarios más frecuentes de SAPHNELO:

- infecciones de las vías respiratorias superiores
- bronquitis
- reacciones a la infusión (cuando se administra por vía intravenosa)
- culebrilla (herpes zóster)
- tos

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de SAPHNELO. Llame a su proveedor de atención médica para obtener asesoramiento médico acerca de los efectos secundarios.

Puede [informar efectos secundarios relacionados con los productos de AstraZeneca](#).

Consulte la [Información de seguridad importante](#) adicional cuidadosamente y la [Información de prescripción](#) completa, incluida la [Información para el paciente](#).



Como uno mismo otra vez

— *con SAPHNELO* —

Para obtener más
información, visite
SAPHNELO.com



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

A continuación, se indican algunos de los efectos secundarios más frecuentes de SAPHNELO:

- infecciones de las vías respiratorias superiores
- bronquitis
- reacciones a la infusión (cuando se administra por vía intravenosa)
- culebrilla (herpes zóster)
- tos

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de SAPHNELO. Llame a su proveedor de atención médica para obtener asesoramiento médico acerca de los efectos secundarios.

Consulte la Información de seguridad importante adicional cuidadosamente y la Información de prescripción completa, incluida la Información para el paciente.

SAPHNELO es una marca registrada y AstraZeneca Access 360 es una marca comercial del grupo de empresas de AstraZeneca.
©2026 AstraZeneca. Todos los derechos reservados.
US-101744 Última actualización 5/26

 **Saphnelo**[®]
(anifrolumab-fnia)
Intravenous Use 300 mg/vial
Subcutaneous Use 120 mg/0.8 mL

AstraZeneca 